

Anti-D -suojaus verensiirron yhteydessä

RhD-negatiivisille henkilöille tarkoituksellisesti tai vahingossa siirretyt RhD-positiiviset punasolut tai trombosyytit voivat johtaa immunisaatioon. Näissä tilanteissa annetulla anti-D suojauksella pyritään ensisijaisesti suojaamaan

- RhD-negatiiviset tytöt ja lapsensaanti-ikäiset naiset, joille RhD-positiivisia verivalmisteita saa antaa vain henkeä uhkaavissa tiloissa
- sukupuolesta riippumatta ne potilaat, jotka tarvitsevat toistuvasti verensiirtoja

Anti-D-suojaus verensiirron yhteydessä

RhD negatiiviselle henkilölle annettu RhD positiivinen verivalmiste	Toimenpide
Punasolut tarkoituksella: hätätilanne, eikä RhD negatiivisia punasoluja ole saatavilla	Ei anti-D -suojausta
Punasolut vahingossa: pieni määrä	Yleensä anti-D -suojaus. Konsultoi Veripalvelun lääkäriä anti-D -suojausten tarpeesta ja määrästä
Trombosyytit (valmisteessa kontaminaationa hyvin vähäinen määrä punasoluja)	Anti-D -suojaus kaikille.
Octaplas®-jääplasma	Octaplas®:sta on poistettu kaikki punasolut, jonka vuoksi Octaplas®:n käytössä ei huomioida RhD-veriryhmää.

Tarkemmat ohjeet ks. Verivalmisteiden käytön opas.