

Vuotokyselylomakkeen pisteytys. Poikkeavaan vuototaipumukseen viittaa pistemäärä ≥ 4 miehillä, ≥ 6 naisilla ja ≥ 3 lapsilla.

Oire	Pisteytys				
	0	1	2	3	4
Nenäverenvuodot	Ei merkittävästi	> 5 / vuosi tai kesto > 10 min	Lääkärintarkastus	Tamponointi, polttohoito, antifibrinolyytti	Verensiirto, DDAVP, hyytymistekijävalmiste
Mustelmataipumus	Ei merkittävästi	> 5 kpl kerrallaan	Lääkärintarkastus	Laajat mustelmat	Verensiirto, DDAVP, hyytymistekijävalmiste
Pienet haavat vuotavat	Ei merkittävästi	> 5 / vuosi tai kesto > 10 min	Lääkärintarkastus	Kirurginen hoito	Verensiirto, DDAVP, hyytymistekijävalmiste
Suuontelon vuodot	Ei merkittävästi	Kyllä	Lääkärintarkastus	Kirurginen hoito, antifibrinolyytti	Verensiirto, DDAVP, hyytymistekijävalmiste
Vuoto hampaanpoiston jälkeen	Ei merkittävästi tai ei hampaanpoistoja	$\leq 1/4$ toimenpiteistä, ei hoitoa	> 1/4 toimenpiteistä, ei hoitoa	Uudelleen ompelu, tamponointi	Verensiirto, DDAVP, hyytymistekijävalmiste
Leikkausvuoto	Ei merkittävästi tai ei leikkauksia	$\leq 1/4$ toimenpiteistä, ei hoitoa	> 1/4 toimenpiteistä, ei hoitoa	Kirurginen hoito, antifibrinolyytti	Verensiirto, DDAVP, hyytymistekijävalmiste
Verivirtsaisuus	Ei merkittävästi	Näkyvää verta virtsassa	Lääkärintarkastus	Kirurginen hoito, rautalääkitys	Verensiirto, DDAVP, hyytymistekijävalmiste
Mahasuolikanavan vuoto	Ei merkittävästi	Spontaani vuoto	Lääkärintarkastus	Kirurginen hoito, antifibrinolyytti	Verensiirto, DDAVP, hyytymistekijävalmiste
Lihaverenvuoto	Ei koskaan	Vamman jälkeen, ei hoitoa	Ilman vammaa, ei hoitoa	DDAVP, hyytymistekijävalmiste	Kirurginen hoito, verensiirto
Nivelverenvuoto	Ei koskaan	Vamman jälkeen, ei hoitoa	Ilman vammaa, ei hoitoa	DDAVP, hyytymistekijävalmiste	Kirurginen hoito, verensiirto
Keskushermostovuoto	Ei koskaan	-	-	Subduraalivuoto (SDH, SDV)	Aivoverenvuoto (ICH, SAV)
Muut vuoto-oireet	Ei merkittäviä	Kyllä	Lääkärintarkastus	Kirurginen hoito, antifibrinolyytti	Verensiirto, DDAVP, hyytymistekijävalmiste
Runsaat kuukautiset	Ei merkittävästi	- Lääkärintarkastus - Kuukautissuojan vaihto < 2 h välein - Hyytymiä vuodossa	- Poissaoloja koulusta tai töistä > 2 kertaa / vuosi - Antifibrinolyytti, ehkäisyvalmiste, rautalääkitys	- Antifibrinolyytti JA ehkäisyvalmiste - Kuukautiset olleet aina runsaat	- Sairaalahoito - Verensiirto, DDAVP, hyytymistekijävalmiste - Kirurginen toimenpide
Synnytysvuoto ja synnytyksen jälkivuoto	Ei merkittävästi tai ei synnytyksiä	- Lääkärintarkastus - Kesto yli 6 viikkoa	Rautahoito, antifibrinolyytti	- Verensiirto, DDAVP, hyytymistekijävalmiste - Kaavinta	Kohdunpoisto, kohtuvaltimon embolisaatio

Muokattu ISTH Bleeding Assessment Tool (ISTH BAT) -kyselyn pohjalta.

http://c.ymcdn.com/sites/www.isth.org/resource/resmgr/ssc/isth-ssc_bleeding_assessment.pdf