

Verivalmisteiden käytön opas 2021 – verkkojulkaisun muutoshistoria

Sivu	Päivitys	Päivitetty verkkojulkaisuun
20	Tarkennettu, että punasolut, lapsille valkosoluton (PSVSLA) valmisteen tilavuus on keskimäärin 90 ml, tarkka sisällön määrä ilmoitetaan etiketissä.	23.6.2022
54, 63	Veriturvatoimiston puhelinaika päivitetty: arkisin klo 9–15.	23.6.2022
56	Tarkennettu anafylaksiaan/voimakkaaseen allergiseen reaktioon liittyviä haittavaikutustutkimuskäytäntöjä. Jatkossa Potilaan IgA-pitoisuus määritetään <u>aina</u> sairaalan laboratoriossa ensisijaisesti ennen verensiirtoa otetusta näytteestä. Jos pitoisuus on alle menetelmän toteamisrajan, toimitetaan veriturvatoimistoon 2 ml seeruminäyte jatkotutkimuksia varten.	23.6.2022
19	Punasolut valkosoluton, pesty (sädetetty, PSVSPE ja PSVSPES) valmisteen indikaatiot kohdasta poistettu "IgA-puutospotilaan kiireetön punasolujen siirto, vaikka potilaalla ei ole vasta-aineita, mutta potilas tarvitsee toistuvia punasolujen siirtoja. Ennen leikkausta tai synnytystä voidaan IgA-puutospotilaan anti-IgA-vastaainetaso tutkia ja, jos vasta-aineita ei todeta, käyttää perusvalmisteita."	9.11.2022
20	Punasolut, lapsille valkosoluton (PSVSLA): Tilavuus keskimäärin 90 ml (70–110 ml), tarkka määrä ilmoitetaan etiketissä. Tekstiviittaukset tilavuudeltaan 100 ml:n pusseihin ja pussisetin keskenään yhtä suuriin valmisteisiin poistettu.	2.2.2023